

TÜTÜN HASTALIK ve ZARARLILARI ZİRAİ MÜCADELE ETKİLİ MADDELERİ*

HASTALIK & ZARARLI	ETKİLİ MADDELER	FORM	DOZU	BEKLEME SÜRESİ
Tütün Fidelerinde Çökerten (<i>Fusarium spp.</i> <i>Pythium spp.</i> <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Altenaria spp.</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	%1,34 Bacillus amyloliquefaciens (B. subtilis) strain QST 713 min.1x10 üzeri 9 cfu/ml	SC	1 ml / m ²	0
	%25 Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat	CR (kristal)	600 g göz taşı + 600 g sönmüş kireç* (Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra)	21 Gün
	%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid	WP	400 g/100 l su, Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde	14 Gün
	%50 Captan	WP	200 g/100 L su	28 Gün
	12,5 g/l Fludioxonil + 5 g/l Metalaxyl	FS	15 ml/m ²	21 Gün
	25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-m	FS	7,5 ml/m ² 3 litre su ile	21 Gün
	360 g/l Hymexazole	SL	200 ml/100 l. su (3 lt/m ² mahlül)	0
	530 g/l Propamocarb + 310 g/l Fosetyl	SL	4 ml/m ² 'ye mahlül	0
Tütün Mildiyözü (Maviküf) (<i>Peronospora tabacina</i> D.B. Adam)	%1,34 Bacillus amyloliquefaciens (B. subtilis) strain QST 713 min.1x10 üzeri 9 cfu/ml	SC	1000 ml / da	0
	%40 Metalaxyl-m + %4 Acibenzolar-s-methyl	WG	20 g/ 100 l su veya da	21 Gün
	%70 Metiram	WG-DF	100 g /100 l su Fidelik ve tarla dönemi	7 Gün
	600 g/l Phosphorous Acid (mono ve di-potasyum tuzları)	SL	300 ml/100 L su	0
Tütün Küllemesi (<i>Erysiphe cichoracearum</i> D.C.)	100 g/l Penconazole	EC	35 ml/100 L su veya 35 ml/da	14 Gün
	100 g/l Tetraconazole	EC	40 ml/100 L su	7 Gün
Tütün Tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	%50 Formetanate hydrochloride	SP	100 g/da Larva+Ergin	56 Gün
	100 g/l Cyantraniliprole	OD	100 ml/da	14 Gün
	50 g/l Deltamethrin	SC	30 ml/da	14 Gün
	790 g/l Neem Yağı + 0,3 g/l Azadirachtin A	EC	500 ml/da	3 Gün
	800 g/l Malathion + 12,8 g/l Gamma-cyhalothrin	EC	100 ml/da	14 Gün
Tütünde Şeftali Yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	%20 Acetamiprid	SP	10 g/ da(nimf, ergin) (Ege, Marmara)	10 Gün
	10 g/l Azadirachtin A	EC	300 ml/da Ergin , nimf	3 Gün
	100 g/l Cyantraniliprole	OD	100 ml/da	14 gün
	20 g/l Pyrethrin	EC	150 ml/da	3 Gün
Tütünde Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	%5 Emamectin benzoate	WG	20 g/da. (Larva)	14 gün
	100 g/l Cyantraniliprole	OD	75 ml/da	7 gün
	35000 DBM/mg Bacillus thuringiensis var. aizawai strain ABTS-1857	WG	100 g/da (Larva)	-
	32000 CLU/mg Bacillus thuringiensis subsp kurstaki ABTS-351 ırkı	DF	100 g/da (Larva)	-
	790 g/l Neem Yağı + 0,3 g/l Azadirachtin A	EC	500 ml/da	3 gün
	%35 Chlorantraniliprole	WG	12 g/da (larva)	14 Gün
Tütün Güvesi (<i>Ephesia elutella</i>)	50 g/l Deltamethrin	SC	30 ml / 100 m ² (En fazla 5 lt su ile)	15 Gün
Tatlı Kurt (<i>Lasioderma serricorne</i>)	50 g/l Deltamethrin	SC	30 ml /100 m ² (En fazla 5 lt su ile)	15 Gün

HASTALIK & ZARARLI	ETKİLİ MADDELER	FORM	DOZU	BEKLEME SÜRESİ
Yeşil kirpi darı = Kirpi darı, Yapışkan ot, KARADARI, İmam pamuğu, Darıcan	360 g/l Clomazone	CS	50 ml/da dikim öncesi	
Yatık sirken, Tarla sarmaşığı, Sürünücü horoz ibiğı, Sirken, Çatalotu	400 g/l Pendimethalin	CS	330 ml/da Tütün dikiminden hemen önce	
Sirken, Semizotu, Püsküllü çayır, Köpek üzümü, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Duv ar arpası, Domuz pıtrağı, Dikenli eşek marulu, Darıcan, Çatalotu	450 g/l Pendimethalin	CS	300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce, dikim öncesi	
Yeşil kirpi darı, Sürünücü horoz ibiğı, Sirken, Semizotu, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Horoz ibiğı, Farekulağı, Darıcan, Dar yapraklı horoz ibiğı, Çobançantası, Bozot, Benekli darıcan	455 g/l Pendimethalin	CS (kapsül süspansiyon)	300 ml/da çıkış öncesi, 300 ml/da Dikim öncesi	
Sürünücü horoz ibiğı, Sirken, Semizotu, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Darıcan, Bozot	960 g/l S-Metolachlor	EC	140 ml/da Fide Dikim Öncesi (Toprağı Karıştırılarak)	

*18.12.2025 tarihinde BKÜ veritabanından oluşturulmuştur. <https://bku.tarimorman.gov.tr/Bitki/Details/70>